



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۲۱۸۰۲  
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳  
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

## معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

### موضوع: دستورالعمل تزریق واکسن رازی کووید

#### با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند مجوز مصرف اضطراری واکسن رازی کووید تولیدی موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی توسط سازمان غذا و دارو صادر شده و واکسن مذکور به سبب واکسن های کووید-۱۹ موجود در کشور اضافه شده است.

خواهشمند است دستور فرمایید قبل از توزیع واکسن نسبت به آموزش واکسیناتورها اقدام شود.

نکات حائز اهمیت در مورد واکسن مذکور به شرح ذیل اعلام می‌شوند:

- هر ویال واکسن حاوی ۲۰ دز است.
- ویال واکسن باید در شرایط ۲-۸ درجه نگهداری شده و از یخ زدگی آن خودداری شود.
- واکسن در دو دز و با فاصله حداقل ۲۱ روز تزریق می‌شود.
- قبل از تزریق ویال واکسن باید به آرامی و به صورت دورانی تکان داده شود.
- تزریق واکسن مذکور در داخل عضله دلتوئید و به میزان ۰/۲ میلی لیتر با استفاده از سرنگ انسولین و سر سوزن ۲۳ انجام می‌شود.

- تزریق با زاویه ۹۰ درجه و در دست غیر غالب انجام شود.

- ویال باز شده واکسن تا ۶ ساعت قابل نگهداری است.



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۲۱۸۰۲  
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳  
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

- موارد منع مصرف واکسن رازی کوویپارس شامل سن زیر ۱۸ سال، بارداری و شیردهی و واکنش آنافیلاکتیک پس از تزریق دز اول یا دوم است.
  - عوارض شایع شامل درد، قرمزی، تورم در ناحیه تزریق، سردرد خفیف، کپیر موضعی (با شیوع کمتر) و کپیر عمومی (در موارد نادر) است.
  - مانند سایر واکسن‌ها، واکسیناسیون در افراد با بیماری تب دار تا زمان بهبودی به تعویق می‌افتد و تزریق آن در افراد مبتلا به کووید-۱۹ نیز تا ۶-۴ هفته بعد از بهبودی کامل توصیه نمی‌شود.
- خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به کلیه مراکز تحت پوشش آن معاونت محترم ابلاغ شود.

**دکتر محمد مهدی گویا**  
ریس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر