



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۱۵۱۷۵  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱  
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

## معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: تجویز دوز سوم واکسن کووید-۱۹ و واکسن مسافری

با سلام و احترام

با توجه به مصوبات کمیته فنی واکسیناسیون کووید-۱۹ و مرور مستندات داخلی و بین المللی برای کسب حداکثر ایمنی لازم و همچنین مراجعات افرادی که بدلیل اضطراب سفر و عدم قبول نوع واکسن دریافت شده (نوبت اول یا دوم) در کشور مقصد دچار مشکل هستند موارد ذیل اعلام می شود:

۱- افراد بالای ۶۰ سال که دو نوبت واکسیناسیون اولیه از واکسن های غیرفعال شده (سینوفارم، کوواکسین بهارات و کووایران برکت) استفاده کرده اند، بایستی نوبت سوم واکسن ترجیحا مشابه نوبت اول (غیرفعال شده) به فاصله ۴ ماه از نوبت دوم دریافت نمایند.

۲- در حال حاضر مستندات علمی برای دریافت دوز چهارم واکسن بویژه واکسن های مصرف شده در کشور، موجود نیست لذا دریافت دوز چهارم توصیه نمی شود.

۳- در خصوص افرادی که به دلیل اضطراب سفر و عدم قبول نوع واکسن دریافتی توسط کشور مقصد، دچار مشکل شده اند کمیته ۳ نفره (اعضا به تشخیص دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی) تشکیل و مجوز تزریق یک یا دو نوبت واکسن آسترازنکا بعنوان نوبت دوم یا سوم به صورت موردی و بعد از بیان هشدارهای لازم در خصوص عوارض احتمالی و اخذ تاییدیه رضایت آگاهانه از فرد اقدام نمایند. حداقل فاصله بین دریافت واکسن نوبت دوم و سوم یک ماه خواهد بود.

دکتر کمال حیدری  
معاون بهداشت