



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۲۴۳۸۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: تزریق دز سوم واکسن کووید-۱۹ در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال

با سلام و احترام

- مصوبه کمیته ملی واکسن کووید-۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ در خصوص تزریق دز سوم واکسن کووید-۱۹ در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
- تجویز دز سوم واکسن کووید-۱۹ در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال دارای ضعف سیستم ایمنی و به فاصله حداقل ۴ ماه از دز دوم توصیه می‌شود.
 - واکسن قابل تزریق در این گروه سنی به عنوان دز سوم، هر یک از واکسن‌های پاستوکوک یا سینوفارم می‌باشد.
 - تعاریف ضعف سیستم ایمنی بر اساس سند کشوری گسترش واکسیناسیون کرونا است (مانند نقایص اولیه سیستم ایمنی، بیماری‌های خاص مانند سرطان تحت درمان با شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی، بیماران پیوند عضو شده، بیماران دریافت‌کننده داروهای سرکوب‌کننده یا تضعیف‌کننده سیستم ایمنی، افراد HIV مثبت، بیماران تحت درمان با دیالیز و ...).
 - ملاک تشخیص ضعف سیستم ایمنی ارائه‌برگه توسط پزشک متخصص بوده و اظهار نظر شخصی و شفاهی افراد مورد قبول نمی‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه مراکز تحت پوشش آن معاونت محترم ابلاغ شود.

دکتر کمال حیدری
معاون بهداشت